


IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

Hoja de información del estudio de investigación


¿El café puede mejorar la recuperación gastrointestinal después de una cirugía?



Parámetro principal: Tiempo hasta el primer flato (gas a través del recto).

Se llevará a cabo un seguimiento del paciente durante 7 días después de la cirugía.

Parámetros de interés:



Tiempo hasta el primer flato



Tiempo hasta la primera defecación



Colocación de una sonda nasogástrica (tubo a través de la nariz que llega hasta el estómago)

IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

Hoja de información del estudio de investigación

- **¿Alguna pregunta sobre el estudio?** Comuníquese con el jefe del centro de investigación (investigador principal): Dr. Jad Abou-Khalil, The Ottawa Hospital - General Campus, 501 Smyth Road, Ottawa, ON, K1H 8L6, Teléfono: 613-798-5555 ext. 79575, Correo electrónico: impacts@toh.ca
- **¿Alguna pregunta sobre sus derechos o sobre problemas éticos en relación con el estudio?** Comuníquese con el presidente del Comité de Ética de Investigación de Sunnybrook llamando al (416) 480-6100 ext. 88144.
- **Tiene derecho a retirarse de este estudio en cualquier momento sin motivo alguno.** Para retirarse, comuníquese con el investigador principal (consulte la información de contacto arriba), quien le informará a la oficina central del estudio; de este modo, no se recopilarán más datos.