

IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

Scheda informativa su uno studio di ricerca

Ricorrenza di ascesso perianale e formazione di fistola: test clinico con antibiotici a seguito di incisione e drenaggio - PARFAIT



Pazienti che siano:

- Di età maggiore o uguale a 18 anni
- Sottoposti a drenaggio e impacco di un ascesso perianale



Amoxicillina +
acido clavulanico
(Antibiotico)



Ciprofloxacina +
Metronidazole
(Antibiotico)



Nessun
antibiotico

Esito principale: Formazione di fistola (passaggio anomalo) entro 6 mesi.

I pazienti saranno contattati settimanalmente nel corso del primo mese dopo l'intervento (e una volta al mese per i successivi 6 mesi) per compilare un sondaggio via email o telefono. Altri esiti di maggior interesse comprendono:



Qualità della vita



Tempo di guarigione



Costi per il sistema
sanitario

IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

Scheda informativa su uno studio di ricerca

- **Avete domande su questo studio?** Contattate il Responsabile di Sito (Investigatore Principale): Dr. David Smith, North York General Hospital, 4001 Leslie St, North York, ON, M2K 1E1, Telefono: 416-476-3835, Email: impacts@nygh.on.ca
- **Avete domande sui vostri diritti o su questioni etiche legate allo studio?** Contattate la presidenza del Comitato Etico di Ricerca del Sunnybrook al numero (416) 480-6100 int. 88144.
- **Avete diritto a ritirarvi da questa sperimentazione in qualsiasi momento per qualunque ragione.** Per ritirarvi, contattate l'Investigatore Principale (vedere informazioni che precedono), che informerà l'ufficio centrale dello studio, e i vostri dati non saranno più raccolti.