

IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

Hoja de información del estudio de investigación

Recidiva de absceso perianal y formación de fístula: estudio sobre la administración de antibióticos después de la incisión y el drenaje - PARFAIT



Pacientes que:

- Tienen ≥ 18 años de edad
- Tienen compresa y drenaje por absceso perianal



Amoxicilina +
Ácido clavulánico
(antibiótico)



Ciprofloxacina +
Metronidazol
(antibiótico)



Sin antibiótico

Parámetro principal: formación de fístula (conducto anormal) dentro de los 6 meses.

Se establecerá contacto con el paciente una vez por semana durante el primer mes después de la cirugía (y una vez al mes durante 6 meses) para completar una encuesta por correo electrónico/teléfono. Otros parámetros de interés:



Calidad de vida



Tiempo de curación



Costos del sistema de salud

IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

Hoja de información del estudio de investigación

- **¿Alguna pregunta sobre el estudio?** Comuníquese con el jefe del centro de investigación (investigador principal): Dr. David Smith, North York General Hospital, 4001 Leslie St, North York, ON, M2K 1E1, Teléfono: 416-476-3835, Correo electrónico: impacts@nygh.on.ca
- **¿Alguna pregunta sobre sus derechos o sobre problemas éticos en relación con el estudio?** Comuníquese con el presidente del Comité de Ética de Investigación de Sunnybrook llamando al (416) 480-6100 ext. 88144.
- **Tiene derecho a retirarse de este estudio en cualquier momento sin motivo alguno.** Para retirarse, comuníquese con el investigador principal (consulte la información de contacto arriba), quien le informará a la oficina central del estudio; de este modo, no se recopilarán más datos.