

# IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

## 研究信息表

### 肛周膿腫復發和瘻管形成：切開引流試驗後的抗生素- PARFAIT



下列患者:

- 滿18周歲
- 將肛周膿腫排幹並包紮



阿莫西林+克拉維酸  
(抗生素)



環丙沙星+甲硝唑  
(抗生素)



沒有抗生素

主要結果：6個月內形成瘻管（異常通道）。

在手術後的第一個月（並且每月一次，共6個月）每週都會聯繫患者，以電子郵件/電話完成調查。其他令人感興趣的結果包括：



生活質量



恢復時間



衛生系統費用

# IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

## 研究信息表

- 對這項研究有疑問嗎？與站點負責人（首席研究員）聯繫：Dr. David Smith, North York General Hospital, 4001 Leslie St, North York, ON, M2K 1E1, 電話: 416-476-3835, 電子郵件: [impacts@nygh.on.ca](mailto:impacts@nygh.on.ca)
- 對您的權利，或對與此研究相關的道德問題有疑問？請致電（416）480-6100分機88144，與Sunnybrook研究道德委員會主席聯繫。
- 您有權出於任何原因隨時退出此研究。要退出，請聯繫首席研究者（請參閱上面的聯繫信息），後者將通知中央研究辦公室，並且不會收集進一步的數據。