

# IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

## Scheda informativa su uno studio di ricerca

### Ricorrenza di ascesso perianale e formazione di fistola: test clinico con antibiotici a seguito di incisione e drenaggio - PARFAIT



Pazienti che siano:

- Di età maggiore o uguale a 18 anni
- Sottoposti a drenaggio e impacco di un ascesso perianale



Amoxicillina +  
acido clavulanico  
(Antibiotico)



Ciprofloxacina +  
Metronidazole  
(Antibiotico)



Nessun  
antibiotico

**Esito principale: Formazione di fistola (passaggio anomalo) entro 6 mesi.**

I pazienti saranno contattati settimanalmente nel corso del primo mese dopo l'intervento (e una volta al mese per i successivi 6 mesi) per compilare un sondaggio via email o telefono. Altri esiti di maggior interesse comprendono:



Qualità della vita



Tempo di guarigione



Costi per il sistema  
sanitario

# IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

## Scheda informativa su uno studio di ricerca

- **Avete domande su questo studio?** Contattate il Responsabile di Sito (Investigatore Principale): Dr. Paul Karanicolas, Sunnybrook Health Sciences Centre, 2075 Bayview Ave, Room T2 16, Toronto, ON, M4N 3M5. Telefono: 416-480-6100 int. 85391, Email: [impacts@sunnybrook.ca](mailto:impacts@sunnybrook.ca)
- **Avete domande sui vostri diritti o su questioni etiche legate allo studio?** Contattate la presidenza del Comitato Etico di Ricerca del Sunnybrook al numero (416) 480-6100 int. 88144.
- **Avete diritto a ritirarvi da questa sperimentazione in qualsiasi momento per qualunque ragione.** Per ritirarvi, contattate l'Investigatore Principale (vedere informazioni che precedono), che informerà l'ufficio centrale dello studio, e i vostri dati non saranno più raccolti.