

# IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

## 研究信息表

### 肛周膿腫復發和瘻管形成：切開引流試驗後的抗生素-PARFAIT



下列患者：

- 滿18周歲
- 將肛周膿腫排幹並包紮



阿莫西林+克拉維酸  
(抗生素)



環丙沙星+甲硝唑  
(抗生素)



沒有抗生素

**主要結果：6個月內形成瘻管（異常通道）。**

在手術後的第一個月（並且每月一次，共6個月）每週都會聯繫患者，以電子郵件/電話完成調查。其他令人感興趣的結果包括：



生活質量



恢復時間



衛生系統費用

# IMPACTS

WWW.IMPACTSPROGRAM.CA

## 研究信息表

- **對這項研究有疑問嗎？與站點負責人（首席研究員）聯繫：** Dr. Paul Karanicolas, Sunnybrook Health Sciences Centre, 2075 Bayview Ave, Room T2 16, Toronto, ON, M4N 3M5. 電話：416-480-6100 分機 85391, 電子郵件：[impacts@sunnybrook.ca](mailto:impacts@sunnybrook.ca)
- **對您的權利，或對與此研究相關的道德問題有疑問？**請致電（416）480-6100分機88144，與Sunnybrook研究道德委員會主席聯繫。
- **您有權出於任何原因隨時退出此研究。**要退出，請聯繫首席研究者（請參閱上面的聯繫信息），後者將通知中央研究辦公室，並且不會收集進一步的數據。